SYNTHÈSES

DE PHARMACIE

ET DE CHIMIE

PRÉSENTÉES ET SOUTENUES A L'ÉCOLE DE PHARMACIE,

les 5 et 9 juillet 4853,

PAR ED. JACQUINOT,

NÉ A SAINTE-RADEGONDE (INDRE-ET-LOIRE).



PARIS.

E. THUNOT ET C*, IMPRIMEURS DE L'ÉCOLE DE PHARMACIE, RUE RACINE, 26, PRÈS DE L'ODÉON.

1855

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE.

MM. DUMÉRIL. BOUCHARDAT.

ÉCOLE SPÉCIALE DE PHARMACIE.

ADMINISTRATEURS.

MM. Bussy, Directeur.
Guibourt, Secrétaire, Agent comptable.
Lecanu, Professeur titulaire.

PROFESSEURS.

MM.	Bussy)
	GAULTIER DE CLAUBRY.	Chimie.
	LECANU)
	CHEVALLIER	Pharmacie.
	GUIBOURT	1
	GUILBERT	Histoire naturelle.
	CHATIN	Botanique.
	CAVENTOU	Toxicologie.
	Soubeiran	Physique.

AGRÉGÉS.

MM. Grassi.
Ducom.
Figuier.
Robiquet.
Reveil.

Note. L'École ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises par les candidats.

SYNTHÈSES H ÉTÉ

DE PHARMACIE ET DE CHIMIE

PRÉSENTÉES ET SOUTENUES A L'ÉCOLE DE PHARMACIE

SIROP DE RAIFORT COMPOSÉ.

(Sirop antiscorbutique.)

SYRUPUS COMPOSITUS DICTUS ANTISCORBUTICUS.

24	Feuilles récentes de Cochléaria (Cochlearia of	licina	lis).	37
	- de Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)."		٠.	37
	de Cresson (Nasturtium officinale)			37
	Racine de Raifort (Cochlearia armoracia).			37
	Oranges amères (Citrus Bigaradia)			37
	Cannelle (Laurus cinnamomum)			1
	Vin blanc généreux (Vinum album)			150
	Sucre (Saccharum).			150

Incisez les plantes et les oranges amères; concassez la cannelle; mettez le tout dans la cucurbite d'un alambic; ajoutez-y le vin blanc, et après deux jours de macération distillez à la chaleur du bain-marie pour obtenir 375 grammes de liqueur aromatique, dans laquelle vous ferez fondre en vase clos la moitié du sucre prescrit.

Passez avec expression les matières restées dans le bain-marie; clarifiez les liqueurs par le repos; ajoutez-y le restant du sucre, et faites un sirop que vous clarifierez avec les blancs d'oufs et que vous passerez; quand il sera presque complétement refroidi vous y mélangrez le premier sirop aromatique.



GELÉE DE MOUSSE DE CORSE.

GELATINA CUM HELMINTHOCORTO.

24	Mousse de Corse (Fucus helminthocorton).		12
- 1	Sucre blanc (Saccharum album)			25
	Vin blanc (Vinum album)			25
	Colle de poisson (Ichthyocolla).			1
	Orters benefitte to motoross de Como mondontes.		hours dane	1117

Faites bouillir la môusse de Corse pendant une heure dans une suffisante quantité d'eau pour obtenir environ 1000 grammes de liqueur; passez avec expression; ajoutez le sucre, le vin blanc et la colle de poisson que vous aurez fait ramollir par macération dans 125 grammes d'eau, et faites cuire en consistance de gelée: passez à travers une étamine, et portez dans un lieu frais.

EXTRAIT DE BELLADONE AVEC LA FÉCULE VERTE.

EXTRACTUM BELLADONÆ CUM FECULA.

 \mathcal{L} Belladone (Atropa belladona) en fleurs. . 3000 Écrasez la belladone et exprimez-en le suc; passez celui-ci à travers une toile, et divisez-le dans des assiettes de faience en couches de 2 lignes d'épaisseur environ; mettez ces assiettes dans une étuve que vous entretiendrez à une température de 35 à h0 degrés jusqu'à ce que le sue soit entièrement desséché; sortez alors les assiettes de l'étuve, et aussitôt que l'extrait se sera suffisamment ramolli à l'air pour pouvoir être détaché aisément, enfermez-le dans des pots ou dans des bouteilles à large ouverture, que vous boucherez avec des bouchons de liége et que vous goudronnerez.

TEINTURE DE DIGITALE FRAICHE.

TINCTURA CUM FOLUS RECENT, DICITALIS PURPUREÆ,

Y Feuilles fraiches de Digitale (Digitalis purpurea). 500 Alcool à 3h° Cart. (86 cent.) (Alcool). 500 Contusez les feuilles de digitale, et faites-les macérer pendant quinze jours dans l'alcool: passez avec expression; filtrez.

EMPLATRE DE SAVON.

EMPLASTRUM CUM SAPONE.

.)-	24	Emplatre simple (Emplast	rum	simple	ex).		1000
		Cire blanche (Cera alba).					45
		Savon blanc (Sapo albus).					60
		aites liquéfier l'emplâtre av s aurez divisé avec un coute					

par l'agitation.

On ajoute souvent du camphre à cet emplàtre; le mieux est de

On ajoute souvent du camphre à cet emplâtre; le mieux est de l'y incorporer à mesure du besoin. La dose la plus ordinaire est de 20 centigrammes de camphre par 31 grammes d'emplâtre.

OXYDE ROUGE DE MERCURE.

(Peroxyde de Mercure.)

OXYDUM HYDRARGYBICUM.

24	Mercure pur (Hydrargyrum).		300
	Acide nitrique (Acidum nitricum) à 35°		300

Introduisez le mercure dans un matras à fond plat, versezl'acide, et placez le matras sur un bain de sable tide jusqu'à ce que le métal soit entièrement dissous. Augmentez alors graduellement la chaleur pour vaporiser le liquide. Quand le intrate de mercure sera desséché élevez la temperature pour le décomposer et continuez jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs nireuses; laissez refroidir lentement l'oxyde avant de le retirer du matras. Si la température avait été trop élevée, ou l'action de la chaleur trop prolongée, l'oxyde lui-même serait décomposé en oxygène et en mercure; on obtiendrait, au contraire, un oxyde mélangé de sous-nitrate de mercure si l'on n'avait pas chausse suffisamment pour décomposer tout l'acide nitrique.

oride tringe de Mescure

acide nitrigue par à 35°

300 / 50 -300 / 5

PROTOCHLORURE D'ANTIMOINE.

(Reurra d' Antimoine)

CHLORUBETUM STIRICUM

% Sulfure d'antimoine (Sulfuretum stibicum) 500 7 (a

Introduisez le surfure dans un matras : adaptez au col de ce matras deux tubes, l'un en S, l'autre droit et long; placez le tout sur un petit fourneau, sous une bonne cheminée; versez l'acide par petites portions à l'aide du tube en S; agitez de temps en temps le matras; élevez graduellement la température jusqu'à l'ébullition : soutenez-la pendant une demi-heure environ : laissez refroidir: décantez dans une capsule en porcelaine ; évaporez au bain de sable jusqu'au tiers à peu près : mettez ensuite la solution concentrée à déposer dans un vase long et étroit : introduisez le liquide clair dans une cornue en verre adaptée à un matras : distillez avec précaution; rejetez les premières portions du produit tant qu'elles ne précipiteront pas par l'addition de l'eau : recueillez les portions suivantes jusqu'à ce que le liquide distillé se fige complétement en se refroidissant; changez alors le récipient; adaptez-en un nouveau bien sec, et passez de temps à autre un charbon ardent sous l'extrémité inférieure du col de la cornue pour éviter qu'il ne s'obstrue. Lorsque la distillation sera achevée. liquéfiez le produit en chauffant le récipient dans un bain-marie ; coulez-le dans de petits flacons longs et étroits, et conservez-le nour l'usage.

On obtient le chlorure d'antimoine liquide en exposant le chlorure solide au contact de l'air.

SULFURE DE SODIUM CRISTALLISÉ:

(Sulfhydrate de Soude.)

SULFURETUM SODICUM CUM AQUA.

Botachlosure Vontanome

Oluffure d'untimaine nulverile rioce chloshydrique à le dig

Uniffygrate to Olinde critallito

100

Dentomitrate reide De Morque

acide mitrique à 3/ Degres

marquant 25° à l'aréomètre. Faites passer dans cette dissolution un courant de gaz acide sulfhydrique, jusqu'à ce qu'elle cesse d'en absorber. Maintenez la liqueur à l'abri du contact de l'air; elle laissera déposer des cristaux incolores et transparents de sulfhydrate de soude. Faites-les égoutter sur un entonnoir . et conser-

vez-les pour l'usage dans des flacons exactement fermés.

Ce sulfhydrate est employé à la préparation de quelques eaux

minérales sulfureuses.

DEUTONITRATE ACIDE DE MERCURE LIQUIDE.

(Nitrate de Mercure liquide.)

NITRAS HYDRARGYRICUS ACIDO NITRICO SOLUTUS.

Acide nitrique (Acidum nitricum) à 35°.

Faites dissoudre le mercure dans l'acide nitrique, et évaporez la dissolution jusqu'à ce qu'elle soit réduite aux trois quarts de son poids primitif, c'est-à-dire à 225. Le nitrate acide de mercure est un liquide dense et très-caus-

tique, que la potasse précipite en jaune.